


↑↑↑↑↑  
↑↑↑↑↑




↑↑↑↑↑  
↑↑↑↑↑



家で飼っている白メダカ

# メダカのオスとメス



## オス

① せびれ  
↓  
きれにみがある  
せびれのきれにみは  
メスを引きよせるのに  
役立つ

② おびれ  
↓  
泳ぐとき一番重要  
な部

③ ぶなびれ  
↓  
泳ぐときの方向に  
体をよけるためのびれ

④ はらびれ  
↓  
少し白ぼくみえる

⑤ しりびれ  
↓  
平行四辺形のような形

## 特長

- ・せびれに切れにみがある
- ・しりびれが平行四辺形のような形をしている
- ・体がメスよりほすこし長  
細い
- ・体がメスより少し色がう  
すく、少し白ぼくみえる

## メス

## メス

① せびれ  
↓  
きれにみがない

② おびれ  
↓  
泳ぐとき一番  
重要な部分

③ ぶなびれ  
↓  
泳ぐときの方向に  
体をよけるためのびれ


④ はらびれ  
↓  
色がこい


⑤ しりびれ  
↓  
三角形のような  
形

## 特長

- ・せびれにきれにみがない
- ・しりびれが三角形のよう  
な形をしている
- ・体がオスより太い
- ・オスより体の色がこい  
産らんをあるとき  
に口をバクバク  
させる


# メダカの卵について

種まき後  

 油まきが全体にちらばる


夜時間後  

 油まきがまとまってくる


白後  

 血液がみえくる

メダカのイネとなる部分が  

 みえくる

もうすぐでたんじょう

十日後  

 世ほねができてくる

十五日後  

 しんごうのもとができる

# ちぎよ、水草について

ちぎよ  
 ・大きくなるとメダカよりも早い物がある  
 ・ちぎよは1週間あたり0.5mm~1mmくらい大きくなる



水草  
 アナカリス 50円 ヒターあり 丈夫



アマゾンリトアラシ 200~400円 ヒターあり 丈夫



アヌビスナナ 500円 ヒターあり 丈夫



アヌビスナナアキ 600~800円 ヒターあり 丈夫



アヌビスバネリ 900~1500円 ヒターあり 丈夫



エキノドルステネリス 500円 ヒターあり 丈夫



エキノドルス  
テネリスロングリーフ 700~800日 E-ターあり



エキノドルス  
オレマニー 300~500日 E-ターあり 丈夫



エシオカリスビビパラ 300~400日 E-ターあり やや丈夫



ウイロ-モス 500日 E-ターなし 丈夫



南米ウイロ-モス 800~1000日 E-ターなし 丈夫



# メダカ<sup>カ</sup>の病<sup>カ</sup>気

エサを食べない

水面で口をパクパクさせる

水底や水草に体をこすりつける

異常な泳ぎをする

ヒレがとける

外傷や発赤がみられる

白点がある。

このような症状が

起きたら別の容器



に移してくわしく  
かんさつする。

# メダカの病気の応急処置

## ①塩水浴

水1Lあたり3g~5gの塩をいれる

\*入れすぎないように注意

## ②病気ごとの応急処置

1 尾ぐされ病

薬液ニューグリーンF:エルバジュエース等に入れる

2 水カビ病

ニューグリーンF:マラカイトグリーンに入れる

3 白点病

水がえをし水温を30度にする



ダイルマ × タカ



ヒ × タカ



アイルビ / × タカ



シロ × タカ