

〔調査結果より乳酸菌群を抜粋〕

山崎研究所において、シードを主食としていた2羽のオカメインコに「キラピピ」を与える前と、1ヶ月間与えた後のフンを採。
外部機関でフンに含まれる細菌の種類と数を調査した結果、乳酸菌群の劇的な増殖が確認されました。

総称	Order（目）	Family（科）	Genus（属）	Species（種） / 通称名		インコA		インコB	
						給餌開始前	1ヶ月給餌後	給餌開始前	1ヶ月給餌後
ビフィズス菌	<i>Bifidobacteriales</i>	<i>Bifidobacteriaceae</i>	(family level ID only)						3.27
乳酸菌	<i>Lactobacillales</i>	<i>Enterococcaceae</i>	<i>Enterococcus</i>	(slash calls)			0.01		
				<i>casseliflavus</i>					0.02
				<i>faecalis</i>	フェカーリス菌				0.45
		<i>Lactobacillaceae</i>	<i>Lactobacillus</i>	(family level ID only)			0.04		0.05
				(genus level ID only)			0.11		0.06
				(slash calls)					0.01
				<i>agilis</i>		0.06		0.39	0.08
				<i>alvi</i>		0.95	49.63	1.68	34.75
				<i>coleshominis</i>			0.02	0.13	0.24
				<i>crispatus</i>			0.81	2.35	55.64
				<i>oris</i>				0.24	
				<i>psittaci</i>		0.01			
				<i>saerimneri</i>			0.88		0.26
				<i>salivarius</i>	乳酸菌LS1	0.93	43.60	1.38	3.46
				<i>secaliphilus</i>		0.01	0.41	0.15	0.60
				<i>taiwanensis</i>					0.01
				<i>vaginalis</i>				0.06	0.14
合計						1.96	95.51	6.38	99.04